



CON TECNOLOGÍA

ReactMAX

Bioestimulante enriquecido con **tecnología React Max** encargado de promover un impulso en el desarrollo de los eventos fisiológicos claves para el rendimiento de cultivos extensivos fungiendo como un precursor de citoquininas.



Diferenciadores

- Producto de alta concentración hormonal.
- Aumenta el rendimiento y la producción.
- Compatible en mezcla con otros productos.
- Efecto inmediato.
- Tecnología de síntesis propia.



COMPOSICIÓN QUÍMICA EN

Extractos de origen vegetal conteniendo las siguientes hormonas y vitaminas biológicamente activas

Citoquinas	2081.90 ppm	Niacina	84.56 ppb
Giberelinas	31.00 ppm	Ácido pantoténico	12.53 ppb
Auxinas	30.50 ppm	Ácido Fólico	0.82 ppb
Colina	748.81 ppb	Riboflavina	0.86 ppb
Tiamina	100.11 ppb	Nicotinamida	0.18 ppb

Diluyentes y acondicionadores

CONTENIDO NETO: 1 L

FABRICANTE Y FORMULADOR: LABORATORIOS AGROENZIMAS, S. A.
 OFICINAS: Carretera No. 12, piso 5 Col. La Loma, Tlattepec de B. S. C.
 Estado de México, México. Tel.: +52 (55) 5366-70-50 Fax: 5366-70-70
 www.agroenzimas.com e-mail: info@agroenzimas.com

Es un producto que apoya los procesos de división y crecimiento celular, situación que afecta fisiológicamente a la planta, logrando su máximo potencial productivo.



Cuadro de recomendaciones

Cultivos	Dosis L/Ha	Época de aplicación
 Aji - pimentón	1.25 cc/L de agua	Al cuaje de los primeros ají-pimentones y repita después de cada corte de cosecha.
 Tomate	1.25 cc/L de agua	A cada piso de floración y fruto, repetir en ciclos de cada 15 a 18 días.
 Melón	1.25 - 1.5 cc/L de agua	1º. Aplique en prefloración. 2º. En plena floración femenina abierta.
 Sandía	1.25 - 1.5 cc/L de agua	1º. Aplique en prefloración. 2º. En plena floración femenina abierta.
 Papa	1.25 cc/L de agua	Al inicio del estoloneo y repita 15 días después.
 Piña	2.0 cc/L de agua	Aplicar en flor media a los 65 días post-forza aproximadamente.
 Arroz	2.0 cc/L de agua	1º. Aplicar en diferenciación del primordio floral. 2º. Aplicar en el momento de 40 a 50% de espiga expuesta.
 Banano	5 - 10 cc/L de agua	Para aumentar tamaño y consistencia de fruto, aplicar a la segunda semana de emergida la floración.
 Café	1.5 cc/L de agua	Formación de nuevos brotes 120 días antes de la floración.
 Cebolla	1.25 cc/L de agua	A los 48 días después del trasplante. A los 64 días después del trasplante.
 Pastos	2.0 cc/L de agua	Aplicar a los 10 días después de último pastoreo.

Objetivos:

- Aumento en la calidad y cantidad de estructura. Amarre y cuaje de frutos.
- Aumento en la producción y calidad de la cosecha.