

Agrokin[®] PLUS 85,14 SL



CON TECNOLOGÍA

ReactMAX

Bioestimulante enriquecido con **tecnología React Max** encargado de promover un impulso en el desarrollo de los eventos fisiológicos claves para el rendimiento de cultivos extensivos fungiendo como un precursor de citoquininas.



Diferenciadores

- Producto de alta concentración hormonal.
- Aumenta el rendimiento y la producción.
- Compatible en mezcla con otros productos.
- Efecto inmediato.
- Tecnología de síntesis propia.





Agrokin[®] PLUS 85,14 SL

Es un producto que apoya los procesos de división y crecimiento celular, situación que afecta fisiológicamente a la planta, logrando su máximo potencial productivo.



Cuadro de recomendaciones

Cultivos	Dosis L/Ha	Época de aplicación
 Aji - pimenton	1.25 cc/L de agua	Al cuaje de los primeros ají-pimentones y repita después de cada corte de cosecha.
 Tomate	1.25 cc/L de agua	A cada piso de floración y fruto, repetir en ciclos de cada 15 a 18 días.
 Melón	1.25 - 1.5 cc/L de agua	1º. Aplique en prefloración. 2º. En plena floración femenina abierta.
 Sandía	1.25 - 1.5 cc/L de agua	1º. Aplique en prefloración. 2º. En plena floración femenina abierta.
 Papa	1.25 cc/L de agua	Al inicio del estoloneo y repita 15 días después.
 Piña	2.0 cc/L de agua	Aplicar en flor media a los 65 días post-forza aproximadamente.
 Arroz	2.0 cc/L de agua	1º. Aplicar en diferenciación del primordio floral. 2º. Aplicar en el momento de 40 a 50% de espiga expuesta.
 Banano	5 - 10 cc/L de agua	Para aumentar tamaño y consistencia de fruto, aplicar a la segunda semana de emergida la floración.
 Café	1.5 cc/L de agua	Formación de nuevos brotes 120 días antes de la floración.
 Cebolla	1.25 cc/L de agua	A los 48 días después del trasplante. A los 64 días después del trasplante.
 Pastos	2.0 cc/L de agua	Aplicar a los 10 días después de último pastoreo.

Objetivos:

- Aumento en la calidad y cantidad de estructura. Amarre y cuaje de frutos.
- Aumento en la producción y calidad de la cosecha.