


Rooting[®] 79.57 SL



CON TECNOLOGÍA **SMARTSELECT**

La **tecnología SmartSelect**, proporciona a la raíz una mejor adaptación ante condiciones adversas de suelo.

Diferenciadores








- Primer producto comercial en el mundo enfocado en estimular raíces.
- Promueve el estímulo y arranque de la planta.
- De fácil aplicación y dosificación en todo tipo de cultivos.
- Resultados a corto plazo.
- Alta compatibilidad con cualquier producto de uso agrícola.

Rooting[®]

79.57 SL






Es una herramienta que está diseñada para estimular y mantener raíces funcionales en todo tipo de cultivo.

Cuadro de recomendaciones

Cultivos	Dosis	Época de aplicación
 Piña	2 - 3 L/ha	Aplicar de 30 a 45 días después del trasplante y/o a los 4 meses después.
 Plátano y banano	1 - 2 L/ha	Aplicar en plantillo a las 6 semanas de siembra y en planta establecida aplicar cada 3 a 4 meses.
 Papa	1 - 2 L/ha	Aplicar al momento de la siembra.
 Yuca, ñame	1 - 2 L/ha	Aplicar a los 30 días de establecido el cultivo.
 Maíz	1 - 2 L/ha	Aplicar al momento de 2 a 3 hojas verdaderas.
 Hortaliza	1 - 2 L/ha	Aplicar una vez establecido el cultivo de 10 a 15 días después de trasplante. Repita la aplicación a los 6 días después de la primera cosecha.
 Curcubitáceas	0.5 - 1L/ha	Dirija la aplicación a la base de la planta o aplicar por sistema de riego presurizado. Aplicar de 8-15 días después de trasplante o con 4 hojas verdaderas en caso de siembra directa. Aplicar con cada cosecha.

Objetivos:

Mejora el anclaje, mayor absorción de agua y nutrientes. Recuperador del sistema radicular afectado por plagas y enfermedades, mantenimiento del sistema radicular envejecido.

 Poroto	0.5 - 1L/ha	Aplicar a los 10 días después de germinado.
 Caña de azúcar	2 L/ha	Aplicar entre los 45 a 60 días después del corte o la siembra.
 Arroz	0.5 - 1L/ha	Aplicación entre los 15 a 18 días después de germinado, con la aplicación de herbicida post-emergente.
 Pasto, céspedes	60 - 100 L/ha	Aplicar 10 a 12 días después de establecido el pasto o césped; después de las primeras lluvias en invierno.
 Café	1 - 2 L/ha	Aplicar 15 días después de establecidas las lluvias. 22 días antes de realizar las aplicaciones de fertilizante granulado.

Objetivos:

Mayor anclaje, absorción de nutrientes y agua, recuperador del sistema radicular y ahijamiento. Mejor adaptación y distribución en campo de la capa vegetal.