









## Cuadro de recomendaciones

	Cultivos	Dosis /ha	Época de aplicación
	Alfalfa	3 L/ ha	10 días después de cada corte
Q	Algodón	3 L/ ha	1ª Aplicación al cuadreo. 2ª Aplicación 15 días después. 3ª 15 días después de la 2a.
	Arroz y avena	3 L/ ha	1ª Aplicación al encañe. 2ª Al embuche. 3ª A la floración.
	Chile	3 L/ ha	1ª. En floración. 2ª. 15 días después 3ª. 15 días después de la 2a
4	Frijol	3 L/ ha	1ª. Aplicación a la floración. 2ª. 15 días después.
ő	Manzana	3 L/ ha	1ª Aplicación después de raleo. 2ª 20 días después. 3ª 20 días después de la 2a.
<b>©</b>	Melón	3 L/ ha	1ª. Aplicación a la floración. 2ª. 15 días después. 3ª. 15 días después de la 2a.
*	Pepino	3 L/ ha	1ª. Aplicación a la floración. 2ª. 15 días después. 3ª. 15 días después de la 2a.
	Sandía	2,5 L/ ha	1ª. Aplicación a la floración. 2ª. 15 días después. 3ª. 10 días después de la 2a.
**	Soya	3 L/ ha	1ª. Aplicación a la floración. 2ª. Aplicación 15 días después.
	Tomate	3 L/ ha	1ª <sub>.</sub> Aplicación a la floración. Repita quincenalmente.
	Trigo	2,5 L/ ha	1ª Aplicación al embuche. 2ª A la floración.
*	Vid	3 L/ ha	1ª. Aplicación a la floración. 2ª. 15 días después. 3ª. 15 días después de la 2a.











