

Agromil[®] PLUS



CON TECNOLOGÍA

ReactMAX



Máximo potencial directo al sitio de acción.

Incrementa la tasa de división celular, lo que mejora la calidad de las estructuras florales, así como el porcentaje de amarre y calidad de los frutos. Su acción citocinínica incrementa la clorofila y evita su degradación, retrasando la senescencia.

Beneficios:

- Potencializa el tamaño de fruto, mejorando la cantidad y calidad de la cosecha.
- Floración más intensa y prolongada que incrementa el rendimiento y da una calidad superior.
- Aumenta los calibres y mejora la uniformidad de frutos.
- Incrementa los puntos reproductivos de los cultivos al mejorar su arquitectura.
- Alta solubilidad y estabilidad en agua.
- Regulador de crecimiento de alta potencia.
- Compatible con agroquímicos de registro vigente.



Cuadro de recomendaciones

Cultivos	Dosis (ppm) ml/100 L de agua	Época de aplicación
 Chile	2 – 2.5	Para inducir brotación de yemas laterales: al inicio del ciclo vegetativo. Mejorar peso, calibre, uniformidad de fruta: al inicio de la floración y cuaje de primeros frutos; repetir tras cada corte.
 Tomate	1 – 2.5	Para mejorar conformación de planta: al inicio del desarrollo vegetativo. Mejorar peso, calibre y uniformidad de fruta: al inicio de floración y cuaje de primeros frutos; repetir tras cada corte (21 días en tomates terminados).
 Calabaza, melón y sandía	1	Para mejorar el desarrollo inicial de las guías: al haber 3-5 hojas verdaderas. Incrementar el amarre de frutos: al inicio de la floración femenina. Mejorar peso, calibre y uniformidad de la fruta: repetir cada 5-10 días después.
 Pepino	0.5 – 1	Para mejorar el amarre de flor y frutos: al aparecer las primeras flores; repetir a los 7 días. Mejorar calibre, uniformidad y peso de la fruta: cada 5-10 días al presentarse frutos jóvenes.
 Cebolla	1	Para mejorar el tamaño, forma y uniformidad del bulbo: aplicar al segundo par de hojas verdaderas.
 Frutales caducifóleos manzana, durazno, pera, ciruela y cereza	1	Para incrementar cuaje, mejorar tamaño y forma de fruta: aplicar al amarre del mismo; repetir 15 días después.
 Cítricos* y mangos *naranja, limón persa, toronja, mandarina, limón mexicano	1 – 1.5	Para uniformar floración y aumentar cuaje de fruta: 15 días antes de la floración. Repetir a la caída de pétalos y con frutos tamaño canica.
 Zarzamora	2.5	Durante la brotación. Al inicio de la floración y amarre (con 8 días de intervalo de seguridad).
 Fresa	2.5	Durante la formación de coronas. Al inicio de la floración y amarre (con 8 días de intervalo de seguridad).
 Uva de mesa	1 – 6	Para mejorar uniformidad de brotación y vigor de brote, así como estructura del racimo según variedad (Perlette, Flame, Thompson y Superior): desde punto verde hasta brotes de 15 cm.
 Piña	1.5 – 2.5	Para mejorar forma y peso de fruto: al secado de pétalos del último tercio del fruto.
 Ornamentales rosas, crisantemos, claveles y nochebuenas	1	Para inducir brotación de yemas laterales: al inicio de la misma o después del desbotone o pinch. Para peso y vida poscosecha de especies producidas en ramillete: justo después del desbotone de la flor apical.
 Papa	1 – 1.5	Para mejorar brotación, aplicar 1 cc al momento de la siembra. Para estolones, aplicar 1.5 cc foliarmente al inicio de dicha etapa fenológica y repetir 15 días después.

Agromil[®] Plus ReactMax incrementa el número de frutos de tomate y la uniformidad en el tamaño de estos, haciendo a los cultivos más productivos y fruta de mayor calidad.

Efecto de las aplicaciones de **Agromil[®] Plus ReactMax** sobre el peso de la sorosis, corona y el volumen (tamaño) de fruta de piña cv. MD2.

