

BRX⁷⁰⁷⁶® Color



Tecnología con actividad superior para frutos de color intenso y tamaño uniforme.

Formulación que, por su contenido de potasio y elicitores, favorece la acumulación de carotenoides y antocianinas para incrementar el color y tamaño de los frutos.

Beneficios:

- Acelera la pigmentación y uniformiza la coloración del fruto.
- Sin efectos en la clorofila, por lo que el follaje se mantiene vivo y activo.
- Aumenta los antioxidantes en las hojas.
- Sin impacto en la maduración, lo que evita el envejecimiento de la planta y el fruto.
- Incrementa la concentración de azúcares en el fruto.





Cuadro de recomendaciones

CultivoS	Dosis	Época de aplicación
 Tomate	0.6 - 5.0 ml/L	Durante el llenado del fruto previo a iniciar cosechas. Puede realizar aplicaciones cada 10 días a dosis bajas (0.6 - 2 ml/L) durante el llenado de fruto y durante todos los cortes para estimular el llenado y maduración uniforme de la fruta. Manejo de dosis altas cuando se piense solo en un corte (5 ml/L).
 Vid	Sweet Celebration 1.0 - 4.0 ml/L	Realice la primera aplicación durante el llenado de fruta y la segunda iniciando el envero, aplique cada 4 - 6 días. Pueden realizarse aplicaciones de forma conjunta con el ethephon y/o ácido abscísico. Maneje dosis baja (1-2 ml/L) con aplicaciones frecuentes y dosis alta (4 ml/L) en una sola aplicación.
	Flame Seedless 1.0 - 4.0 ml/L	Realice la primera aplicación durante el llenado de fruta y la segunda iniciando el envero aplique cada 4 - 6 días. Pueden realizarse aplicaciones de forma conjunta con el ethephon y/o ácido abscísico. Maneje dosis baja (1-2 ml/L) con aplicaciones frecuentes y dosis alta (4 ml/L) en una sola aplicación.
	Sweet Sapphire 5-10ml/L	Realice dos aplicaciones previo a cosecha una vez iniciado el envero.
	Summer Royal 5-10ml/L	Realice de dos a tres aplicaciones previo a cosecha una vez iniciado el envero de forma conjunta con el ethephon, manejando dosis de 5 ml/L o intercaladas con mismo a dosis de 5-10 ml/L.
 Fresa	1-2L/ha	Cuando inicia el cambio de color de frutos y repita cada 10 días.
 Mango	2-4L/ha	Para acelerar la coloración de frutos al inicio de cambio de color.
 Frambuesa	2L/ha	Al inicio del cambio de color y repita cada 10 días.

Efecto de la aplicación de **BRX⁷⁰⁷⁶ Color** sobre el color de fruta de tomate híbrido DRD 8551, aplicado al inicio del cambio de color de los primeros frutos.

Efecto de la aplicación de **BRX⁷⁰⁷⁶ Color** sobre el color de fruta de uva de mesa cv. Flame Seedless a dosis de 1 ml/L de agua.



Testigo



BRX⁷⁰⁷⁶ Color 5 ml/L

