

Agromil[®]V



CON TECNOLOGÍA

AdStrong



Bioestimulante con fitohormonas y vitaminas para que tus cultivos no dejen de crecer.

Agromil[®]V es un complemento de multi-compuestos que la planta necesita en etapas críticas de su desarrollo. También puede ser empleado como aditivo para biorreguladores.

Beneficios:

- **Suplemento para que tu cultivo nunca deje de crecer.**
- **Activador del desarrollo del cultivo.**
- **Maximiza el potencial productivo.**
- **Produce floraciones intensas y uniformes.**
- **Alta estabilidad a ultra bajo volumen.**
- **Reduce el efecto negativo del estrés en la planta.**
- **Alto contenido de compuestos bioactivos.**
- **Promueve el crecimiento vegetativo y reproductivo armónicos.**






Cuadro de recomendaciones

Cultivos	Dosis (L/ha)	Época de aplicación
Chile y tomate	500 ml / ha por aplicación	Durante el crecimiento vegetativo, al inicio de floración y cada 15 días sobre fructificación.
Fresa	500 ml / ha por aplicación	Mensualmente, iniciando al momento de la floración.
Mango, cítricos y aguacate	1 ml / L de agua por aplicación	Al inicio de la floración, al obtener fruta en tamaño canica y 20 días después.
Manzana, pera, ciruela, guayaba, durazno y nogal	1 ml / L de agua por aplicación	Al obtener el 30-50 % de la floración, repetir a los 15 días y 30 días después de la segunda aplicación.
Melón, sandía,	1 ml / L de agua por aplicación	1ra. Al inicio de la floración 2da. De tres a cuatro semanas después
Ornamentales	1 ml / L de agua por aplicación	1ra. De 10 a 20 cm de altura 2da. De 3 a 4 semanas después de la primera
Papa	500 ml/L de agua por aplicación	1ra. Al inicio de la formación de los tubérculos. 2da. De 3 a 4 semanas después.
Piña	1 ml / L de agua por aplicación	Para estimular el crecimiento: 45 días después del trasplante. Para mantener crecimiento vegetativo armónico: mensualmente. Para estimular la formación del fruto: 20 días después de la inducción, durante la floración y 30 días posteriores al cierre de pétalos.
Plátano y banano	300 - 600 ml / ha por aplicación	Para estimular crecimiento: mensualmente, a dosis baja. Para inducir tolerancia a condiciones adversas: un mes antes del factor adverso y cada 15-20 días durante la condición adversa, a dosis alta.
Uva de mesa	1 ml / L de agua por aplicación	Cuando el brote tenga 10 cm. En combinación con reguladores de crecimiento, para potencializar su efecto.
Ajo, brócoli y lechuga	500 ml / ha por aplicación	Al contar con 2-3 pares de hojas; repetir 1-2 semanas después.
Caña y maíz	1000 ml / ha	Al contar con 6-8 hojas.
Cebolla	500 ml / ha por aplicación	1a.- De 2 a 3 pares de hojas 2a.- De 1 a 2 semanas después
Alfalfa	500 ml / ha por aplicación	Aplicaciones mensuales, aplicando después del corte 3 días después del riego
Algodón	500 ml / ha por aplicación	1a.- Al inicio del cuadro 2a.- De 3 a 4 semanas después
Trigo, arroz, cebada y avena	500 - 750 ml/ha	Al amacollamiento

Efecto de las aplicaciones de **Agromil[®]V AdStrong** sobre el número de semanas a parición de banano cv. Gran enano.



Efecto de la aplicación de **Agromil[®]V AdStrong** sobre el número de tallos de caña cv. CP72-2086 en comparación con un estimulante comercial

