

Aciggib® 10%

CON TECNOLOGÍA
ReactMAX



Regulador de crecimiento a base de ácido giberélico que optimiza el desarrollo.

Aciggib® 10% es un producto a base de ácido giberélico líquido, amigable con el medio ambiente y formulado con la **tecnología ReactMAX**. Su novedosa formulación activa el crecimiento de tejidos firmes y consistentes.

Beneficios:

- Activa el crecimiento de los cultivos.
- Reacción inmediata una vez aplicado.
- Impulsa y uniformiza la brotación en el tratamiento de tubérculos.
- En ciertas especies apoya la floración.
- Formulación amigable con el medio ambiente.
- Dosificación de fácil manejo.
- Impulsa la germinación de semillas

Corporativo

📍 Canaima 12, piso 5, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Edo. de Méx, México. CP 54060

☎ +52 55 5366 7050



CUADRO DE RECOMENDACIONES

CULTIVOS	DOSIS (ppm) ml/100 L de agua	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Uva de Mesa:	10	Alargamiento de raquis: al contar con racimos de 5 cm.
Thompson Seedless	15	Raleo de flores: al inicio de la floración.
y Black Seedless	40	Crecimiento de fruta: al contar con fruta de 4-5 mm; repetir 7 días después.
Red Globe	40 - 50	Crecimiento de frutos: dirigido al racimo, una vez que cuente con un diámetro de fruta de 14-16 mm.
Flame Seedless	5 - 7	Raleo de flores: al contar con el 50-70 % de floración de 14-16 mm.
Perlette	30	Crecimiento de fruta: al contar con fruta de 4-5 mm; repetir 7 días después de 14-16 mm.
Red Seedless	40	Crecimiento de fruta: al contar con fruta de 4-5 mm; repetir 7 días después de 14-16 mm.
Ruby Seedless	25	Crecimiento de fruta: al contar con fruta de 6-9 mm, directo al racimo.
Moscato Rosada	1 - 2	Crecimiento de fruta: en plena floración.
Papa	20	Para evitar corredura y emparejar tamaño de fruta: después de la cuaja.
Piña	10	Para estimular brotación: 24 horas antes de siembra, mediante inmersión de la papa durante 5 minutos.
Cucurbitáceas	5 - 10	Crecimiento vegetativo: al inicio y durante el crecimiento.
Ornamentales y rosas	150 - 200	Retraso de la maduración y translucidez: al inicio de la maduración del fruto (cuatro semanas antes de la cosecha) y al obtener 5° Brix.
Tomate y chile	15 - 20	Calidad de fruta: 14 días antes de la cosecha.
Zarzamora	5 - 15	Crecimiento de tallo: en momentos críticos.
Arándano	10 - 20	Apoyo a la floración: al inicio de la floración.
Frambuesa	100	Crecimiento inicial de desarrollo vegetativo.
	50	1ª estimulación para brotación.
	30 - 50	2ª estimulación para brotación.
	5 - 10	Estimulación de tamaño de fruta.
	15 - 30	Formación de nuevas cañas.
	15 - 30	Estimulación de tamaño de fruta.
		Desarrollo y formación de cargadores.



NOTA 1: Acigib® 10% ReactMAX necesita que se acide la solución de aplicación a niveles inferiores a 5, con tal de proteger la degradación del ingrediente activo en la solución a asperjar.

NOTA 2: La aplicación de este producto es parte de un tratamiento integral del cultivo, se recomienda cuidar el manejo agronómico y las condiciones ambientales que afecten directamente el resultado ideal.

Efecto de la aplicación de Acigib® 10% ReactMAX sobre la translucidez (arriba) y color de cáscara (abajo) de piña cv. MD2 al momento de la cosecha.

Efecto de la aplicación de 5 ppm de Acigib® 10% ReactMAX sobre el crecimiento de plantas de tomate bajo condiciones de invernadero 15 días después de la aplicación.

