



Agromil[®]V



CON TECNOLOGÍA

AdStrong



**Bioestimulante con
fitohormonas y vitaminas
para que tus cultivos
no dejen de crecer.**

Agromil[®]V es un complemento de multi-compuestos que la planta necesita en etapas críticas de su desarrollo. También puede ser empleado como aditivo para biorreguladores.

Beneficios:

- **Suplemento para que tu cultivo nunca deje de crecer.**
- **Activador del desarrollo del cultivo.**
- **Maximiza el potencial productivo.**
- **Produce floraciones intensas y uniformes.**
- **Alta estabilidad a ultra bajo volumen.**
- **Reduce el efecto negativo del estrés en la planta.**
- **Alto contenido de compuestos bioactivos.**
- **Promueve el crecimiento vegetativo y reproductivo armónicos.**



Corporativo



Canaima 12, piso 5, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Edo. de Méx, México. CP 54060




+52 55 5366 7050



Cuadro de recomendaciones

Cultivos	Dosis(ppm) ml/L de agua	Época de aplicación
Chile y tomate	500 ml / ha por aplicación	Durante el crecimiento vegetativo, al inicio de floración y cada 15 días sobre fructificación.
Fresa y zarzamora	500 ml / ha por aplicación	Fresa: En formación de corona dos aplicaciones con intervalo de doce días, en vegetativo, floración, amarre de fruta y producción. Zarzamora: Desarrollo vegetativo, desarrollo de cargadores, floración y fructificación.
Mango, cítricos y aguacate	1 ml / L de agua por aplicación	Al inicio de la floración, al obtener fruta en tamaño canica y 20 días después.
Manzana, pera, ciruela, guayaba, durazno y nogal	1 ml / L de agua por aplicación	Al obtener el 30-50 % de la floración, repetir a los 15 días y 30 días después de la segunda aplicación.
Melón, sandía, pepino y calabaza	500- 1000 ml / ha por aplicación	Al inicio del crecimiento vegetativo y sobre la floración; repetir cada 15 días.
Ornamentales	1 ml / L de agua por aplicación	Al contar con 10-20 cm de altura; repetir cada 3 semanas.
Papa	500 ml / ha por aplicación	Al inicio de la formación del tubérculo. Repetir 3-4 semanas después.
Piña	1 ml / L de agua por aplicación	Para estimular el crecimiento: 45 días después del trasplante. Para mantener crecimiento vegetativo armónico: mensualmente. Para estimular la formación del fruto: 20 días después de la inducción, durante la floración y 30 días posteriores al cierre de pétalos.
Plátano y banano	300 - 600 ml / ha por aplicación	Para estimular crecimiento: mensualmente, a dosis baja. Para inducir tolerancia a condiciones adversas: un mes antes del factor adverso y cada 15-20 días durante la condición adversa, a dosis alta.
Uva de mesa	1 ml / L de agua por aplicación	Cuando el brote tenga 10 cm. En combinación con reguladores de crecimiento, para potencializar su efecto.
Ajo, cebolla, brócoli y lechuga	500 ml / ha por aplicación	Al contar con 2-3 pares de hojas; repetir 1-2 semanas después.
Caña y maíz	1000 ml / ha	Al contar con 6-8 hojas.

Efecto de las aplicaciones de Agromil® V AdStrong sobre el número de semanas a parición de banano cv. Gran enano.



Efecto de la aplicación de Agromil® V AdStrong sobre el número de tallos de caña cv. CP72-2086 en comparación con un estimulante comercial

