



Activador de la división celular para el crecimiento, naturalmente.

Crezym[®]BA incrementa la cantidad, uniformidad, tamaño y calidad de los frutos gracias al poder de la bencilaminopurina en su máxima expresión.

Beneficios:

- Propicia el entorno para facilitar la absorción foliar de compuestos biorreguladores y bioestimulantes.
- Formulación que maximiza la capacidad para estimular la división celular.
- Alta efectividad para incrementar el tamaño de la fruta.

Corporativo

Canaima 12, piso 5, Col. La Loma, Tlalnepan de Baz, Edo. de Méx, México. CP 54060

+52 55 5366 7050



Cuadro de recomendaciones

Cultivos	Dosis (ppm) ml/L de agua	Época de aplicación
Zarzamora Arándano	2.5	Directo* sobre botones florales, flores y frutos jóvenes** en crecimiento. Repetir cada 15 días.
Fresa	1 - 2	Directo sobre botones florales, flores y frutos jóvenes en crecimiento. Repetir cada 20 días.

* Limitado a cinco aplicaciones por ciclo.
 ** En frambuesa se recomienda efectuar una pequeña prueba por cultivo antes de su aplicación comercial, a dosis de 0.1-0.5 ml/L de agua a asperjar.

Efecto de Crezym[®]BA sobre el diámetro polar y el diámetro ecuatorial de **zarzamora**.
 Michoacán, México.




CREZYM[®]BA

2.5 ml/L



TESTIGO ABSOLUTO



CREZYM[®]BA 2.5 ml/L
 TESTIGO ABSOLUTO

Efecto de Crezym[®]BA sobre el diámetro polar y el diámetro ecuatorial de **arándano**.
 Michoacán, México.



CREZYM[®]BA

2.5 ml/L



TESTIGO ABSOLUTO

