

Corporativo



(\$\) +52 55 5366 7050









Cuadro de recomendaciones

	Cultivos	Dosis	Época de aplicación
***	Maíz, sorgo, trigo, cebada y avena	1.5 L/ha	· Aplicar durante la presencia de la 4ta hoja y repetir en el llenado de grano.
	Frijol, garbanzo, haba y chícharo	1-2 L/ha	· Aplicar al inicio de la floración y repetir cada 15 días.
	Tomate, tomate verde y chile	2 - 5 L/ha	· Aplicar durante la presencia de la 4ta hoja y repetir en el llenado de grano.
	Melón, sandía, calabaza y pepino	2 - 4 L/ha	· Durante la floración, repita al inicio y crecimiento del fruto.
•	Aguacate	3 - 6 L/ha	· En plena floración y repetir a intervalos de 15-20 días haciendo 5-6 aplicaciones durante el ciclo.
***************************************	Apio, Lechuga, Col. Coliflor	2 - 4 L/ha	· Realice las aplicaciones cada 10 días, iniciando a mediados del ciclo y hasta la cosecha.
	Papa	2 - 4 L/ha	· Aplicar al inicio de la tuberización. Repetir 15 y 30 días después.
	Alfalfa	1-2 L/ha	· Aplicar cuando la planta tenga de 4 a 6 hojas verdaderas y después de cada corte.
*	Caña de azúcar	1.5 L/ha	· Aplicar durante el desarrollo vegetativo

Feuillaje® CABO estimula los compuestos de defensa natural de las plantas, incrementando la tolerancia a factores adversos abióticos.











